

★休薬される患者様は、この用紙を持ち帰り休薬の指示に従ってください★

検査当日はこの用紙を必ずお持ちください。

ヨード造影剤を使用する検査を受けられるかたで
糖尿病治療薬を服用している皆さまへ

様

糖尿病治療薬のうち、ビグアナイド系のお薬を服用している方の場合、
造影剤を使用する検査を受けたあとに、頻度としてはまれですが
「乳酸アシドーシス」という重篤な副作用が起こることがあります。

乳酸アシドーシスとは、初期症状として食欲不振、嘔気・嘔吐、腹痛、下痢などの
胃腸症状が急激に出現し、進行すると倦怠感、筋肉痛・痙攣、脱力感、腰痛、
胸痛、過呼吸、脱水、低血圧などを引き起こし、昏睡状態に陥ることもあります。
上記の副作用を防止するため、ビグアナイド系の糖尿病治療薬を服用している方は、
医師の指示する期間は同薬剤の服用を中止して下さい。

なお、服用している糖尿病治療薬の中にビグアナイド系の薬があるかどうかわから
ない場合は、この用紙を持参の上、処方してもらっている医療機関にご確認下さい。

ビグアナイド系の糖尿病治療薬は処方されていない方

⇒休薬の必要はありません

ビグアナイド系の糖尿病治療薬を服用している方

検査予定日 年 月 日

⇒下記の期間の休薬をお願いします。

年 月 日 ~ 年 月 日

担当医

★休薬される患者様は、この用紙を持ち帰り休薬の指示に従ってください★

検査当日はこの用紙を必ずお持ちください。

ご質問・お問い合わせは下記連絡先までお願い致します

医療法人 松浦会 姫路第一病院 放射線科

〒671-0234 姫路市御国野町国分寺143

TEL 079-252-0581 (代表)

FAX 079-253-1995